

Profilaktyka jodowa – punkty dystrybucji na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Drodzy mieszkańcy!


Realizując zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym, Gmina utworzyła 9 Punktów Wydawania Preparatów Jodowych:

- Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.; ul. Kuracyjna 30;
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus”, ul. Łąkowa 33;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach; ul. Obrońców Westerplatte 11;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach; ul. Grunwaldzka 6 (budynek d. gimnazjum);
- Szkoła Podstawowa w Obrzynowie; Obrzynowo 37;
- Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie; Rodowo 14;
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach; Trumiejki 42;
- Budynek OSP Kołodzieje; Kołodzieje 35A;
- Świetlica wiejska w Sypanicy; Sypanica 36A.

Aktualnie nie ma powodów, by rozpocząć wydawanie jodku potasu obywatelom. Gmina jest przygotowana, a obywatele mogą czuć się bezpiecznie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną broszurą informacyjną dotyczącą profilaktyki jodowej, a w przypadku wystąpienia wątpliwości zażycia związanych z aktualnym stanem zdrowia o skontaktowanie się ze swoim lekarzem prowadzącym.

DODATKOWE INFORMACJE



Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

PROFILAKTYKA JODOWA

BROSZURA INFORMACYJNA


W przypadku awarii elektrowni jądowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasycza tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu


rejestrmedyczne.ezdrowie.gov.pl





JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!


Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrazić zdrowiu.

- dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 do 12 r. ż.: 1 tabletkę (50 mg jodu)
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r. ż.: ½ tabletki (25 mg jodu)
- noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)



 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 Ministerstwo Zdrowia

 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych





Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem



Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przelamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

-  jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
-  jeśli masz nadczynność tarczycy
-  jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
-  jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa)

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAŻAJ, JEŚLI:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
- jesteś odwodniony
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę

PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

przed przyjęciem leku

- w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia
- w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

po przyjęciu leku

- z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy



Wydawanie tabletek jodku potasu w przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywało się w punktach dystrybucji zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po otrzymaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Profilaktyka jodowa – punkty dystrybucji na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Podziel się:

- [Click to share on Twitter \(Opens in new window\)](#)
- [Click to share on Facebook \(Opens in new window\)](#)
- [Click to share on Pinterest \(Opens in new window\)](#)